

> Les parasites internes

Deux tiers des chiens ont des vers ! Votre chiot a très certainement été contaminé dans le ventre de sa mère, lors de la tétée et par son environnement. Les vers qui vivent dans son intestin sont des parasites, ils y vivent à ses dépens et peuvent entraîner certains troubles (altérer sa croissance, provoquer des troubles digestifs, diminuer l'immunité vaccinale...) ou mettre en péril votre santé, car certaines formes larvaires de vers peuvent infester l'homme. Les vers des chiens sont de deux formes : vers plats (*tenia*) et vers ronds (*ankylostomes*, *ascaris* et *trichures*). À la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous recommandons pour une protection complète de votre chiot qu'il soit vermifugé tous les mois de l'adoption jusqu'à ses six mois, et de deux à quatre fois par an ensuite, selon les cas.



Les ascaris

Les chiots sont très souvent infestés par les ascaris, qui lui viennent en général de sa mère. Ces vers de 20 cm environ prélèvent les nutriments de la ration de votre chiot, et provoquent un retard de croissance et des troubles intestinaux fréquents : diarrhée ou constipation, vomissements, et parfois obstruction intestinale avec perforation. L'homme peut facilement se contaminer en ingérant des oeufs de ces vers.

Les enfants sont particulièrement vulnérables, c'est pourquoi la vermifugation est très importante.

Le tenia

Ce ver plat est le plus fréquent. Il peut mesurer jusqu'à 80 cm, mais on n'en voit en général que des anneaux (qui ressemblent à des grains de riz) sur les selles ou autour de l'anus des chiens infestés. C'est leur présence dans cette zone très sensible qui pousse les chiens à frotter leur derrière sur le sol. Il est d'autant plus difficile de se débarrasser de ce parasite que les chiens se réinfestent régulièrement en ingérant des puces contaminées par des larves de tenia.

À la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous recommandons donc de compléter la vermifugation par un traitement efficace contre les puces.

Les trichures

Ce sont des parasites du gros intestin du chien qui mesurent 2 à 4 cm et se nourrissent du sang de leur hôte. Ils peuvent à ce titre entraîner une anémie voire une colite hémorragique. Les chiens se réinfestent régulièrement en avalant des oeufs de trichures présents dans le milieu extérieur. C'est pourquoi à la Clinique Vétérinaire Paris 17, nous recommandons une vermifugation régulière des chiens.

Quel vermifuge choisir et à quel moment traiter ?

Attention ! Tout médicament actif contre les vers peut être dénommé vermifuge, mais tous les vermifuges ne sont pas actifs contre tous les vers ! En venant chercher votre vermifuge à la Clinique Vétérinaire Paris 17, vous obtiendrez le vermifuge adapté à votre chien, à sa physiologie et à son rythme de vie, en plus de conseils personnalisés.

Les chiots doivent être traités tous les 15 jours jusqu'à 2 mois puis tous les mois jusqu'à 6 mois. Les adultes doivent être traités tous les 3 à 6 mois en fonction de leur niveau d'exposition et de la présence ou non de jeunes enfants dans la famille.

Les femelles gestantes doivent être traitées 2 à 3 jours avant la saillie et 15 jours avant et après la mise bas.

